

获取更多信息：

堪培拉减少伤害和倡议联盟(CAHMA)
GPO Box 1552
CANBERRA ACT 2601
(02) 6279 1670
www.cahma.org.au

北领地艾滋病与肝炎委员会(NTAHC)
GPO Box 2826
DARWIN NT 0801
(08) 8944 7777
www.ntahc.org.au

昆士兰州注射者倡议与行动组织(QuIVAA)
PO Box 2470
FORTITUDE VALLEY BC QLD 4006
07 3620 8160
www.quivaa.org.au

维多利亚州减少伤害组织(Harm Reduction Victoria)
PO Box 12720, A' Beckett Street
MELBOURNE VIC 8006
(03) 9329 1500
www.hrvic.org.au

南澳肝炎协会 (Hepatitis SA)
PO Box 782
KENT TOWN SA 5071
(08) 8362 8443
www.hepatitissa.asn.au


新南威尔士州药物使用者与艾滋病协会 (NUAA)
PO Box 350
STRAWBERRY HILLS NSW 2012
(02) 8354 7300
www.nuaa.org.au

昆士兰州注射者卫生网络(QuIHN)
PO Box 2470
FORTITUDE VALLEY BC QLD 4006
(07) 3620 8111
www.quihn.org

塔斯马尼亚州药物使用者健康与支持联盟 (TUHSL)
C/- PO Box 4702
Bathurst Street Post Office
HOBART TAS 7000
tuhstaste@gmail.com

西澳减少伤害互助组织(Peer Based Harm Reduction WA)
PO Box 8003
PERTH WA 6849
(08) 9325 8387
www.harmreductionwa.org

注射 会接触 血液。



血液 携带 病毒。




www.aivl.org.au


避免感染。



1 在调配药剂之前，所有人都需要用肥皂和温水洗手，或用酒精湿巾擦拭手指。



2 用一张纸覆盖用来准备药剂的区域。



3 如果止血带上有血迹，请不要使用——换一条干净的止血带。如果您的衬衫上有血迹，请脱掉衬衫。



6 注射结束后，请安全地处理针头和带有血迹的衣物。



5 如果您需要协助朋友注射，请在每次注射后洗手。



4 注射前请务必使用肥皂和温水洗掉手指上的血迹。

